

Obsah označení obalu

Cimex-Out

Č. j. k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 29056/2013/SOZ.

Insekticidní přípravek v podobě koncentrátu zahuštěné emulze k ředění vodou.

Přípravek s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a ochraně potravin.

Obsah biologicky účinných látek: 30 g (3%) alfa-cypermethrinu (sloučenina ze skupiny pyrethroidů) a 170 g (17%) chlorfenapyru (sloučenina ze skupiny karbonitrylů) v 1 litru produktu.

URČENÍ:

Cimex-Out je přípravek určený k profesionálnímu hubení hmyzu: much, komárů, muchniček, rusů domácích, švábů, štěnic, mravenců faraonů, rybenek domácích apod.

Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, továrenských, skladovacích, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

DOPORUČOVÁNA KONCENTRACE:

1,0% (100 ml preparátu v 10 l vody).

Přípravek hubí lezoucí hmyz po uplynutí 1,5-4 hodin a létající hmyz po uplynutí 20-40 minut od použití.

Dezinsekční zákroky by se neměly v žádném případě konat v přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen. Nedoporučuje se používání přípravku v místnostech, ve kterých pobývají staří lidé a alergici.

Nesmí se postříkat žádné potraviny nebo volně skladované krmivo pro zvířata.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Zárok může být prováděn pomocí většiny typů postřikovačů používaných k hubení hmyzu v uzavřených prostorách.

Základním pravidlem správného provedení zároku je důkladné pokrytí tekutinou (do momentu počátku jejího minimálního stékání) dezinfekovaného povrchu. Postříkat lze ne více než 1/3 plochy místnosti.

V případě hubení lezoucího hmyzu (štěnic, rusů domácích, švábů apod.) je nutno zvláštní pozornost věnovat místům jejich hnízdění (kouty stěn a podlah, škvíry, štěrby, prostupy trubek a kabelů, místa s lištami, tapetami a obložením, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytků a obrazů, digestoře apod.).

V případě hubení much je třeba postříkovat plochy, na kterých se mouchy zdržují nejraději (prosluněné části zdí, okolí oken, svítidel, nosné sloupy, přepážky, místa odkládání odpadků – pokud se nevyužívají jako krmivo pro zvířata apod.).

DÁVKOVÁNÍ:

Doporučována koncentrace užitkové tekutiny: 1% (100 ml produktu na 10 l vody).

Jeden litr pracovní tekutiny vystačí pro postřik cca 20m² povrchu.

PŘÍPRAVA UŽITKOVÉ TEKUTINY:

Určete potřebné množství přípravku. Obsah lahve dobře protřepejte. Odměřte určené množství přípravku a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte. Vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé suspenze. Ihned proveďte zárok.

Po práci pečlivě umyjte vybavení. Zbytky nespotřebované užitkové kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dřívě postříkané povrchy. Vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dřívě postříkané povrchy za použití stejných osobních ochranných prostředků. Odpad produktu, jako i produkt s prošlou spotřební lhůtou náleží zutilizovat dle platných právních předpisů.

DOBA PŮSOBENÍ:

Přípravek působí po dobu několika týdnů a je závislý na kvalitě provedení zároku, druhu postřikované plochy, teplotě, vlhkosti, prašnosti apod.

Na plochách bílých vápnem rychle podléhá deaktivaci.

Přestává působit po umytí, setření, spláchnutí apod. postříkané plochy.

POZNÁMKY:

1. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata.
2. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.
3. Vepřiny postříkujte od výšky 1,5 m a kraviny od výšky 2 m od podlahy nahoru.
4. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.
5. Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.
6. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.
7. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.
8. Zabraňte unášení přípravku průvanu.
9. Nepostříkujte dětské postýlky a hračky.
10. Nepostříkujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.
11. Přípravená užitková kapalina se musí spotřebovat co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den.
12. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.
13. Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.
14. Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou k mytí vylijte co možná nejdál od vodních nádrží a zdrojů.
15. Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen. Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi.

SKLADOVÁNÍ:

S 47/49 – Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C,

S 7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený,

Zabraňte promrznutí přípravku.

POZOR: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRAZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

PRVNÍ POMOC

Při nadýchání:

Osobu postiženou kontaminací odstranit z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch.

Při požití:

V případě podezření otravy ihned přivolat lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ! Osobě v bezvědomí se nesmí podávat nic vnitřně a nesmí se vyvolávat zvracení!

Při styku s kůží:

V případě polítní sundat znečištěný oděv a potřísněnou kůži umýt dobře vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako: svědění, pálení nebo tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, je nutno přivolat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

V případě kontaminace očí odstranit kontaktní čočky a oči ihned promývat proudem vody po dobu cca. 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.

V případě otravy se pozoruje:

neuróza, příznaky alergie, pocity úzkosti, mravenčení při doteku, ataxie, třesavka.

LÉKÁŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší

Toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Datum výroby:..... Obsah netto:..... Doba upotřebitelnosti 36 měsíců

Č. šarže:.....

Výrobce: ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J. (firemní značka)
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 78 A
tel./fax: +48 32 753-09-17, -33, -87;
mobil: +48 609 99 48 48
e-mail: biuro@asplant.com.pl, www.asplant.com.pl

Dovozce do ČR:  **KREJSA**
E-SHOP / PORADENSTVÍ / OBCHOD

Mgr. Miloš Krejsa
561 63 Nekoř 74
tel./fax: +420465625163
info@krejsashop.cz
www.krejsashop.cz

CIMEX-OUT

Insekticidní přípravek.

Obsah biologicky účinných látek: 30 g a-cypermethrinu (sloučenina ze skupiny pyrethroidů) a 170 g chlorfenapyru (sloučenina ze skupiny karbonitrylu) v 1 litru produktu.

Označení škodlivosti pro prostředí:

N



Nebezpečný pro životní prostředí

Xn



Zdraví škodlivý

R48/22 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

R50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- S 1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
- S 13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
- S 20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
- S 23 – Nevdechujte rozstříkanou užitkovou tekutinu
- S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- S 27/28 – Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení, při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- S 29 – Nevylévejte do kanalizace
- S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
- S 46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!